

EQUIPO DIGESTOR PARA DETECCIÓN DE TRIQUINA



Equipo para llevar a cabo el análisis por medio del método de digestión de muestras colectivas con utilización de un agitador magnético.

SKU: ZKZ001

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El equipo digestor para detección de triquina se utiliza para el análisis por medio del método de digestión de muestras colectivas con utilización de un agitador magnético, método oficial según Norma Europea.

El equipo completo se compone de las siguientes referencias:

- LBD001 Agitador magnético digital c/calefacción mod 692/1. Estructura metálica robusta y muy estable con varilla y pinza para sujeción de electrodo o termómetro. Placa de agitación metálica con recubrimiento cerámico, pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura. Protección contra sobrecalentamiento: alarma sonora y desconexión automática del sistema de calefacción.

- PQB030 Embudo decantación 2L, abierto, p/equipo triquina
- PQL006 Embudo cilíndrico 50mL, abierto, p/equipo triquina
- ZKZ002 Tamiz 100x40, 180 µm
- FCB005 Soporte pie plato 300x180 mm con varilla 10x600mm
- FCV004 Aro con espiga 105 mm, acero cromado
- FCV002 Aro con espiga 65 mm, acero cromado
- FCG001 Pinza 2 dedos sin nuez, 12-45 mm
- FCP002 Nuez doble pintada mediana, 16 mm (3 uds)
- CBC005 Vaso forma baja 3000 mL
- LDB001 Imán teflonado cilíndrico 55x8 mm
- DBG003 Probeta graduada vidrio, 25 mL
- DGJ010 Pipeta graduada 25 mL / 0,1 mL
- MBJ009 Aspirador pipetas, 25 mL rojo
- LDR010 Varilla agitación PP
- BRB012 Bolsa de 20 placas Rodac cuadrículadas

¿Qué es la Triquinosis?

La triquinosis es una enfermedad parasitaria y transmisible. Esta originada por el consumo de carnes crudas o mal cocinadas que estén parasitadas con larvas de un nematodo del género *Trichinella*, del cual existen distintas especies.

Los principales síntomas que se presentan en una persona afectada, por orden cronológico, son: manifestaciones gastrointestinales, como dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea. Edema de párpados superiores seguido de hemorragias subconjuntivales y retinianas con dolor y fotofobia. Dolores musculares, sed, sudación, escalofríos, debilidad, postración, fiebre.

¿Cómo se utiliza el digestor de Triquina?

<https://youtu.be/avYJ5s42Xxg>